




Evolución de las heridas crónicas através de la Escala RESVECH 1.0 en pacientes con atención domiciliaria.

Experiencia exitosa

Madonia Isabel Paz Wilches.
Enf. Especialista en Cuidado Crítico
Gestión Integral del Cuidado Ltda.
Barranquilla 2017.



**Las heridas crónicas
constituyen un problema de
salud pública**

**Problema de salud evitable
que genera repercusiones
psicológicas, económicas,
dolor e incomodidad,
discapacidad y muerte con
implicaciones éticas y legales.**

**Necesidad de tomar acciones
encaminadas a mejorar la
calidad de vida en pacientes
con heridas crónicas,
brindando atención eficiente
para que el paciente alcance
una cicatrización temprana y a
menor costo.**

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPLEJIDAD Y DIFICULTAD DE LA CICATRIZACIÓN





**Son necesarios
instrumentos validados,
que puedan ser aplicables
a diferentes tipos de
heridas y que sean fáciles
de usar al lado de la cama,
para facilitar la
identificación y el
seguimiento en la
evolución de las heridas.**



COMUNICACIONES

- ¹⁷⁸ Desarrollo de un índice de medida de la evolución hacia la cicatrización de las heridas crónicas

Development of a wound healing index for chronic wounds

Juan Carlos Restrepo-Medrano
José Verdú Soriano

Universidad de Antioquia. Medellín.
Universidad de Alicante. Alicante.

Correspondencia:

Juan Carlos Restrepo-Medrano

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia.

Campus San Vicente del Raspeig. AP 99. Universidad de Alicante

03080 Alicante

Teléf.: 965 90 39 19

Fax: 965 90 39 64

E-mail: jcrm6@alu.ua.es


Esta comunicación obtuvo el Premio GNEAUPP-Convatec SL Memorial Sergio Juan Jordán a la Mejor Comunicación Científica presentado en el VIII Simposio Nacional sobre Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Santiago de Compostela. Noviembre 2010.

La validez de esta herramienta es alta, y su uso clínico es aceptable.

Resultados Esperados De La Valoración Y Evolución De La Cicatrización De Las Heridas Crónicas "RESVECH 1.0"

1. Dimensiones de la lesión
2. Profundidad/tejidos afectados
3. Bordes
4. Maceración
5. Tunnelizaciones
6. Tipo de tejido en el lecho de la herida
7. Exudado
8. Infección/inflamación (signos de biofilm)
9. Frecuencia del dolor (en los últimos 10 días)

Creciente interés en mejorar la intervención y el seguimiento de pacientes con heridas crónicas.




```
graph TD; A[Creciente interés en mejorar la intervención y el seguimiento de pacientes con heridas crónicas.] --> B[No existen estudios previos en nuestro medio que reporten el uso de la escala Resvech 1.0 en pacientes con heridas crónicas que reciban atención domiciliaria]; B --> C[Objetivo: Describir la experiencia en el uso de la escala RESVECH 1,0 para medir la evolución de la cicatrización de heridas crónicas en pacientes que recibieron atención domiciliaria en el periodo de enero 2015 a abril del 2016.];
```

No existen estudios previos en nuestro medio que reporten el uso de la escala Resvech 1.0 en pacientes con heridas crónicas que reciban atención domiciliaria

Objetivo: Describir la experiencia en el uso de la escala RESVECH 1,0 para medir la evolución de la cicatrización de heridas crónicas en pacientes que recibieron atención domiciliaria en el periodo de enero 2015 a abril del 2016.

Equipo colaborador



Auxiliares de Enfermería

Metodología

Muestra

- Registros de enfermería de 15 pacientes que ingresaron al programa domiciliario de manejo de heridas crónicas.

Instrumento de Medición

- Se estimó con la escala RESVECH V. 1.0. Tiene nueve ítems, cada uno de los ítems genera una puntuación total, que oscila entre 0 y 40 puntos.
- **Cuanto mayor es la puntuación, mayor es la complejidad de la lesión y viceversa.**

Procedimiento

- Capacitación de las enfermeras en el uso de la escala.
- Aplicación: Valoración de ingreso al programa
- Procedimiento de curación: cada 48 o 72 horas conforme a las directrices establecidas en el protocolo con evaluación de la HC

Resultados

Periodo enero 2015- abril del 2016

15 pacientes domiciliarios atendidos	364 evaluaciones a 24 heridas
---	----------------------------------

Género	53.3 % hombres 46.6% mujeres
--------	---------------------------------


Promedio de la puntuación inicial	12.5
--------------------------------------	------

Promedio de puntuación final	8.2
------------------------------	-----

Promedio de cicatrización en días	45.5 días
--------------------------------------	-----------

Estancia media en el programa de atención domiciliaria	45.5 días
---	-----------

Evolución de las heridas crónicas con la escala RESVECH 1.0




PTI: 17




PTF: 15




Evolución de las heridas crónicas con la escala RESVECH 1,0



Evolución de las heridas crónicas con la escala RESVECH 1.0



Evolución de las heridas crónicas con la escala RESVECH 1.0



PTI:11




PTF:0



Evolución de las heridas crónicas con la escala RESVECH 1.0

- 11 y 2



Conclusiones

- Esta experiencia sugiere que la escala Resbech 1.0 es un instrumento fácil de usar en pacientes con atención domiciliaria, para medir la evolución de las lesiones crónicas hacia la cicatrización, favoreciendo al raciocinio clínico y por lo tanto una mejor intervención.
- **Recomendaciones:** futuros estudios que evalúen la efectividad del tratamiento/ costos y su relación con la puntuación de la escala.



GRACIAS...